

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक/3198 /2020/सत्रह-1/IDSP/697

नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2020

प्रति,

1. समस्त अधिष्ठाता,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, छत्तीसगढ़

विषय:- कोविड-19 संक्रमण के उपचार एवं बचाव हेतु Treatment Protocol प्रयोग किये जाने के संबंध में ।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड-19 संक्रमण के उपचार एवं बचाव के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक दिनांक 07.09.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार आईसीएमआर द्वारा समय-समय में जारी निर्देशों के तहत Primary Contacts के लिए Prophylaxis Treatment एवं Home Isolation मरीजों के लिए Treatment Protocol जारी किया जा रहा है। कृपया पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

RP

(रिणु जी. पिल्ले)

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग

नवा रायपुर, दिनांक: 08/09/2020

पृ0क. 3199/2020/सत्रह-1/IDSP/698

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/महामारी नियंत्रण, छत्तीसगढ़
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।

RP


अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा
चिकित्सा शिक्षा विभाग


तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण के उपचार एवं बचाव हेतु ICMR एवं एम्स द्वारा जारी FAQ के अनुसार Chloroquine/ Hydroxychloroquine (HCQ) के प्रयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार अभिमत हैं:-


क्र.	विवरण	आई.सी.एम.आर गाईड लाईन
1	Prophylaxis for Primary contacts	Hydroxychloroquine (HCQ) 400mg. BD पहले दिन व 400mg. भोजन के पश्चात व्यस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाना है। तत्पश्चात 500/400mg. प्रति सप्ताह (07 सप्ताह तक)।
2	For Prophylaxis in front line workers	Hydroxychloroquine (HCQ) 400mg. BD पहले दिन व 400mg. भोजन के पश्चात व्यस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाना है। तत्पश्चात 500/400mg. प्रति सप्ताह (07 सप्ताह तक)।
3	For treatment of covid Positive	Asymptomatic or Mild Symptomatic पुष्ट रोगियों में Hydroxychloroquine (HCQ) 400mg. BD पहले दिन व 400mg. प्रति दिन (04 दिन तक) भोजन के पश्चात व्यस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाना है।


नोट:-


- उपरोक्त निर्देश आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार है।
- मरीज एवं उनके परिजन को औषधियां लेने से पूर्व उनसे सहमति अनिवार्य रूप से लेना सुनिश्चित करें
- Tab. Chloroquine/ Hydroxychloroquine (HCQ) को हृदय रोग (Cardiomyopathy & Cardiac Arrhythmia) से ग्रसित मरीजों को एवं 15 वर्ष के कम आयु के बच्चों को प्रदान नहीं किया जावेगा।
- Tab. Ivermectin गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं 02 वर्ष के कम आयु के बच्चों को नहीं दिया जाना है।
- विटामिन सी 500 (दो बार प्रतिदिन) एवं जिंक 50 (01बार 10दिनों के लिये) की गोलिया अतिरिक्त तौर पर सभी को वजन के हिसाब से लेना सुनिश्चित करें।


संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
रायपुर छ.ग.


अतिरिक्त संचालक
चिकित्सा शिक्षा
रायपुर छ.ग.


संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय
रायपुर छ.ग.


विभागाध्यक्ष
श्वासन विभाग
चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर छ.ग.


प्रभारी अधिकारी
गहन चिकित्सा विभाग
चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर छ.ग.